

تم تسجيل ما مجموعه بين 100-110 نوعاً من بطنيات القدم التي تعيش على اليابسة أو في المياه العذبة في أرخبيل سقطرى حيث أن 90% منها متوطنة، ولا يعرف إلا القليل عن نمط حياتهم وتوزيعهم. نظراً لأن العديد من الأنواع لا توجد في أي مكان آخر في العالم باستثناء هذه الجزيرة، فإنها تحتاج إلى جهد خاص لحمايتها ومعرفة المزيد عنها، وتجذوا في هذا المنشور الأنواع التي يسهل تمييزها.



حلزون دم الاخوين (*Cinnabarica socotrana*)
اعتبر هذا النوع نادراً بالسابق والان بات يعرف بأنه يتوزع على نطاق واسع في الجزيرة، ويعيش على لحاء شجر دم الاخوين وتتميز رأس القشرة بقمة وردية.



حلزون سقطرى (*Socotora naticoides*)
إحدى أكبر القواقع الموجودة في الجزيرة، وقد يصل الحيوان البالغ منها إلى 5 سم في الارتفاع، يعيش تحت الحجارة أو في أعماق الشقوق أو التربة.



باسامبلا بوليتا (*Passamaella polita*)
ذو شكل بصلي والأسنان في الكوة تمنح الأنواع مظهرًا فريدًا، لا يتواجد إلا في مرتفعات جبال حجر.



حلزون الشجر السقطري (*Achatinelloides socotorensis*)
يمكن العثور تلك الحيوانات ذات النقش المتعرج في حالة سكون خلال فترات الجفاف في مجموعات كبيرة على السيقان للشجيرات الكبيرة والأشجار الصغيرة.



حلزون دجلة (*Achatinelloides tigris*)
مشابه لـ حلزون سقطرى لكنها ذات قوقعة ممتدة و تفتقد بنية الضلع على سطح القشرة.



الليثيديون (*Lithidion lithidion*)
يتواجد هذا الحلزون الصغير ذو القشرة المسطحة في أجزاء كبيرة من الجزيرة ولكن يغيب عن المرتفعات العالية لجبال حجر.



زوتكس كونتيغس (*Zootecus contiguus*)
هذا النوع متوطن في جزيرة عبد الكوري يمكن العثور عليه في الرمال الصحراوية الجافة من السهول الحصوية حتى القمم.



بلفوريا أرجوتا (*Balfouria arguta*)
يتوزع هذا النوع على الجزيرة بأكملها تقريباً. في كثير من الأحيان، يتم تمويه سطح القشرة بالطين الملصق عليه بواسطة الحيوان.



ريببكيكا سوكوتورانا (*Riebeckia socotorana*)
إذا ألقيت نظرة فاحصة تلاحظ وجود تشكيل مجهري على سطح هذه الأصداف المغزلية الكبيرة.